



FACULTAD DE MEDICINA – UNIVERSIDAD DE CONCEPCION



PATOLOGIA GENERAL

Casos clínico patológicos

INFLAMACION Y REPARACION

Dr. Jaime Madariaga Boero

CASO 1 :

Mujer, 23 años.

Refiere dolor intenso en fosa ilíaca derecha y sensación febril, iniciados el día anterior a la consulta.

Ingresa al Hospital conciente, febril 39,5° de temperatura axilar, con compromiso del estado general.


Al examen físico, hay signos de irritación peritoneal, signo de Blumberg +


El caso se interpreta como abdomen agudo, y es sometida a laparotomía.






B-11208-2004







CASO 2 :

Mujer, 28 años.

Refiere dolor intenso en hipocondrio derecho y sensación febril, de 2 días de evolución.



Al examen físico, tiene fiebre alta, ictericia, abdomen sensible a la palpación.

La ecotomografía abdominal muestra cálculos en la vesícula biliar.


Se decide conducta quirúrgica, realizándose colecistectomía.





1 2 3 4 5 6 7 8 B-07709-2004



B-07709-2004







CASO 3 :


Mujer, 34 años.

Evoluciona durante 1 semana con estado séptico, fiebre fluctuante, abdomen sensible, con hepatomegalia dolorosa.


Es tratada con antibióticos de amplio espectro.


La ecotomografía abdominal muestra lesiones hepáticas múltiples ecolúcidas.


La paciente evoluciona mal, con shock séptico, y fallece.



AN 298-88
♀ 34 años








Caso 4 :


Mujer de 78 años.


Fue sometida a cirugía menor para resección de un tumor cutáneo benigno, el que fue extraído completamente.


Falta a los controles y curaciones posteriores. Se presenta 2 semanas después, con la herida operatoria abierta.


El cirujano decide ampliar la resección previa.











Caso 5 :



Mujer de 27 años.

Tiene antecedentes de cirugía abdominal previa 1 año atrás.

Se presenta con dolor abdominal intenso y signos de obstrucción intestinal.


A la palpación abdominal se identifica masa tumoral voluminosa periumbilical.


Se realiza laparotomía exploradora, extrayéndose completamente la lesión tumoral.






10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 B-09618-2004 140 150







Caso 6 :

Hombre de 53 años.

Antecedente de etilismo crónico y hemorragia digestiva alta.

Ingresó al Servicio de Urgencia en mal estado general, febril, disnéico. Se le diagnostica bronconeumonía e insuficiencia respiratoria. Durante su hospitalización cursa con episodios de hemorragia digestiva alta.

Fallece en insuficiencia respiratoria.

