Universidad de Concepción
Facultad de Ingeniería Agrícola

ESPACIOS VECTORIALES

Facultad de Ingeniería Agrícola
www.fiaudec.cl

Juan Carlos Sandoval Avendaño

Edición Julio 2020

ESPACIOS VECTORIALES

1 Espacio Vectorial

Un *espacio vectorial* es una terna $(V, +, *)$ donde V es conjunto no vacío, $+$ es una operación denominada suma, y $*$ es otra operación llamada producto por escalar. Los elementos de V se denominan vectores y las operaciones mencionadas deben satisfacer las siguientes propiedades, para $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ y $\mathbf{c} \in V$, α y $\beta \in \mathbb{K}$

S1) $\mathbf{a} + \mathbf{b} = \mathbf{b} + \mathbf{a}$ Propiedad conmutativa

S2) $\mathbf{a} + (\mathbf{b} + \mathbf{c}) = (\mathbf{a} + \mathbf{b}) + \mathbf{c}$ Propiedad asociativa

S3) Existe $\theta_V \in V$ tal que $\mathbf{a} + \theta_V = \theta_V + \mathbf{a} = \mathbf{a}$ Elemento neutro

S4) Para cada $\mathbf{a} \in V$ existe $-\mathbf{a} \in V$ tal que

$$\mathbf{a} + (-\mathbf{a}) = (-\mathbf{a}) + \mathbf{a} = \theta_V \quad \text{Elemento opuesto}$$

PE1) $\alpha * (\mathbf{a} + \mathbf{b}) = \alpha * \mathbf{a} + \alpha * \mathbf{b}$

PE2) $(\alpha + \beta) * \mathbf{a} = \alpha * \mathbf{a} + \beta * \mathbf{a}$

PE3) $(\alpha\beta) * \mathbf{a} = \alpha(\beta * \mathbf{a})$

PE4) $1 * \mathbf{a} = \mathbf{a}$, donde 1 es el elemento neutro de $\mathbb{K}$

El conjunto $\mathbb{K}$ de escalares puede ser $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$, pero de ahora en adelante trabajaremos con espacios vectoriales reales, es decir, $\mathbb{K} = \mathbb{R}$.

Es común mencionar sólo el conjunto V cuando nos referimos a un espacio vectorial, y no anotar la terna $(V, +, *)$.

▮ 2 Propiedades Adicionales para un espacio vectorial

- 1) El elemento neutro θ_V es único
- 2) El elemento opuesto es único
- 3) $\alpha \theta_V = \theta_V, \alpha \in \mathbb{R}$
- 4) $\mathbf{a} \theta_V = \theta_V, \mathbf{a} \in V$
- 5) $(-\alpha) \mathbf{a} = -(\alpha \mathbf{a}); \alpha \in \mathbb{R}, \mathbf{a} \in V$
- 6) $\alpha \mathbf{a} = \theta_V \Rightarrow \alpha = 0 \text{ ó } \mathbf{a} = \theta_V$

▮ 3 Ejemplos de Espacios Vectoriales

1) $V = \mathbb{R}$

Suma

$$a + b; a, b \in \mathbb{R}$$

Producto por escalar

$$\alpha a; \alpha \in \mathbb{R}, a \in \mathbb{R}$$

2) $V = \mathbb{R}^2$

Suma

$$\mathbf{a} + \mathbf{b} = [a_1, a_2] + [b_1, b_2] = [a_1 + b_1, a_2 + b_2]; \mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^2$$

Producto por escalar

$$\alpha \mathbf{a} = \alpha [a_1, a_2] = [\alpha a_1, \alpha a_2]; \alpha \in \mathbb{R}, \mathbf{a} \in \mathbb{R}^2$$

3) $V = \mathbb{R}^3$

Suma

$$\mathbf{a} + \mathbf{b} = [a_1, a_2, a_3] + [b_1, b_2, b_3] = [a_1 + b_1, a_2 + b_2, a_3 + b_3]; \mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^3$$

Producto por escalar

$$\alpha \mathbf{a} = \alpha [a_1, a_2, a_3] = [\alpha a_1, \alpha a_2, \alpha a_3]; \alpha \in \mathbb{R}, \mathbf{a} \in \mathbb{R}^3$$

4) $V = \mathbb{R}^n, n \in \mathbb{N}$

Suma

$$\mathbf{a} + \mathbf{b} = [a_1, a_2, \dots, a_n] + [b_1, b_2, \dots, b_n] = [a_1 + b_1, a_2 + b_2, \dots, a_n + b_n]; \mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$$

Producto por escalar

$$\alpha \mathbf{a} = \alpha [a_1, a_2, \dots, a_n] = [\alpha a_1, \alpha a_2, \dots, \alpha a_n]; \alpha \in \mathbb{R}, \mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$$

5) $V = \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$

Suma

$$A + B = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdot & \cdot & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdot & \cdot & a_{2n} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdot & \cdot & a_{mn} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdot & \cdot & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdot & \cdot & b_{2n} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ b_{m1} & b_{m2} & \cdot & \cdot & b_{mn} \end{pmatrix}$$
$$= \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} & \cdot & \cdot & a_{1n} + b_{1n} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} & \cdot & \cdot & a_{2n} + b_{2n} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ a_{m1} + b_{m1} & a_{m2} + b_{m2} & \cdot & \cdot & a_{mn} + b_{mn} \end{pmatrix}; A, B \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$$

Producto por escalar

$$\alpha A = \alpha \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdot & \cdot & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdot & \cdot & a_{2n} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdot & \cdot & a_{mn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha a_{11} & \alpha a_{12} & \cdot & \cdot & \alpha a_{1n} \\ \alpha a_{21} & \alpha a_{22} & \cdot & \cdot & \alpha a_{2n} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \alpha a_{m1} & \alpha a_{m2} & \cdot & \cdot & \alpha a_{mn} \end{pmatrix};$$

$$A \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{R}), \alpha \in \mathbb{R}$$

6) $V = \mathcal{P}_n(\mathbb{R}) =$ conjunto de todos los polinomios de grado menor o igual a n , con coeficientes reales.

Suma

Supongamos que $p \leq q \leq n$

$$\mathbf{a} + \mathbf{b} = (a_0 + a_1x + \dots + a_px^p) + (b_0 + b_1x + \dots + b_qx^q)$$
$$= (a_0 + b_0) + (a_1 + b_1)x + \dots + (a_p + b_p)x^p + \dots + (a_q + b_q)x^q; \mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathcal{P}_n(\mathbb{R})$$

Producto por escalar

$$\alpha \mathbf{a} = \alpha(a_0 + a_1x + \dots + a_px^p) = (\alpha a_0 + \alpha a_1x + \dots + \alpha a_px^p); \alpha \in \mathbb{R}, \mathbf{a} \in \mathcal{P}_n(\mathbb{R})$$

7) $V = \mathcal{C}[c, d] =$ conjunto de todas las funciones continuas en el intervalo $[c, d]$

Suma

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x); f, g \in \mathcal{C}[c, d]$$

Producto por escalar

$$(\alpha f)(x) = \alpha f(x); \alpha \in \mathbb{R}, f \in \mathcal{C}[c, d]$$

T 4 Subespacio Vectorial

Sea $(V, +, *)$ un espacio vectorial y sea $S \subseteq V$

S es un *subespacio vectorial* de V sí y sólo si se cumplen las propiedades

i) $S \neq \emptyset$

ii) $\mathbf{a} \in S, \mathbf{b} \in S \Rightarrow \mathbf{a} + \mathbf{b} \in S$ Clausura para la suma

iii) $\alpha \in \mathbb{R}, \mathbf{a} \in S \Rightarrow \alpha * \mathbf{a} \in S$ Clausura para el producto por escalar

Si S es subespacio vectorial de V , entonces lo escribiremos $S \leq V$

T 5

Sea $(V, +, *)$ un espacio vectorial.

a) Los conjuntos $\{\theta_V\}$ y V son subespacios vectoriales de V , denominados subespacios vectoriales triviales.

b) Un subespacio vectorial siempre contiene al vector nulo θ_V del espacio V .

c) Un subespacio vectorial S es un espacio vectorial con las mismas operaciones suma y producto por escalar de V

T 6 Combinación Lineal

Sea V un espacio vectorial y sea $B = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\} \subseteq V$.

El vector $\mathbf{v}$ es *combinación lineal* (C.L.) de los vectores de B si existen escalares $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ tales que

$$\mathbf{v} = \alpha_1 * \mathbf{v}_1 + \alpha_2 * \mathbf{v}_2 + \dots + \alpha_n * \mathbf{v}_n = \sum_{i=1}^n \alpha_i * \mathbf{v}_i$$

Como observación, podemos mencionar que el vector nulo θ_V es combinación lineal de cualquier conjunto de vectores.

Por otro lado, el conjunto de todas las combinaciones lineales de vectores de $B = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, denotado $\langle B \rangle$, forma un subespacio vectorial, es decir,

$$\langle B \rangle = \left\{ \sum_{i=1}^n \alpha_i * v_i, \alpha_i \in \mathbb{R}, i = 1, 2, \dots, n \right\} \leq V$$

conocido como el *subespacio generado por B*, o como el subespacio generado por los vectores $v_1, v_2, \dots, v_n$

▣ 7 Conjunto linealmente independiente y linealmente dependiente

Sea V un espacio vectorial y sea $B = \{v_1, v_2, \dots, v_n\} \subseteq V$.

El conjunto B es *linealmente independiente* (l.i.) sí y sólo si

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i * v_i = \theta_V \Rightarrow \alpha_1 = 0, \alpha_2 = 0, \dots, \alpha_n = 0$$

Lo anterior significa que el sistema de ecuaciones lineales homogéneo

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i * v_i = \theta_V \text{ posee única solución.}$$

El conjunto B es *linealmente dependiente* (l.d.) si no es linealmente independiente; esto significa que el sistema de ecuaciones lineales homogéneo

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i * v_i = \theta_V \text{ posee infinitas soluciones.}$$

▣ 8

- a) Todo conjunto que contenga al vector nulo del espacio vectorial es l.d.
- b) Todo conjunto con un sólo elemento distinto del nulo es l.i.
- c) El conjunto vacío es l.i.

d) Si el conjunto $B = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ es l.d., entonces uno de los vectores de B es combinación lineal de los restantes. Además, si uno de los vectores es combinación lineal de los restantes, entonces el conjunto es l.d.

e) Todo subconjunto de un conjunto l.i. es l.i.

f) Todo conjunto de vectores que contenga un subconjunto l.d. es l.d.

g) Un conjunto B es l.i. si ningún vector de B es combinación lineal de los restantes.

T 9 Base de un Espacio Vectorial

Sea V un espacio vectorial y sea $B = \{v_1, v_2, \dots, v_n\} \subseteq V$.

El conjunto B es *base* de V si y sólo si

i) $\langle B \rangle = V$

ii) B es l.i.

T 10

a) La igualdad $\langle B \rangle = V$ significa que todo vector de V se puede escribir como combinación lineal de los vectores de B

b) $\emptyset$ es base de $\{\theta_V\}$

c) Dos bases cualesquiera de un mismo espacio vectorial tienen el mismo número de elementos

T 11 Dimensión de un Espacio Vectorial

La *dimensión de un espacio vectorial* es el número de elementos de una base cualquiera del espacio.

La dimensión de un espacio vectorial V se denota $\dim(V)$

▮ 12

a) $\dim(\{\theta_V\}) = 0$

b) $\dim(\mathbb{R}) = 1$

c) $\dim(\mathbb{R}^2) = 2$

d) $\dim(\mathbb{R}^n) = n$, con $n \in \mathbb{N}$

e) $\dim(\mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{R})) = m \cdot n$

f) $\dim(\mathcal{P}_n(\mathbb{R})) = n + 1$

g) $\dim(\mathcal{C}[c, d]) = \infty$

h) Trabajaremos sólo con espacios vectoriales de dimensión finita.

i) Si $B = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\} \subseteq V$ y $\dim(V) = n$, entonces B es base de V si B es l.i. Esto significa que si el número de vectores de B coincide con la dimensión del espacio, sólo bastaría probar que B es l.i. para concluir que es base

j) Si $\dim(V) = n$ y $S \leq V$, entonces $\dim(S) \leq n$

k) Si $\dim(V) = n$, $S \leq V$ y $\dim(S) = n$, entonces $S = V$

▮ 13 **Coordenadas de un Vector con Respecto a una Base**

Sea V un espacio vectorial y sea $B = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ una base de V .

Un vector $\mathbf{v}$ cualquiera de V se puede escribir de manera única como combinación de los vectores de B , es decir, existen escalares únicos α_i tales que

$$\mathbf{v} = \sum_{i=1}^n \alpha_i * \mathbf{v}_i$$

El vector $[\mathbf{v}]_B = [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n]$ se denomina *vector de coordenadas* o *vector coordenado* de $\mathbf{v}$ con respecto a la base $B = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$

EJERCICIOS ESPACIOS VECTORIALES

[1] Muestre que $R = \{ax - a, a \in \mathbb{R}\} \leq \mathcal{P}_1(\mathbb{R})$

Solución:

i) $R \neq \emptyset$, pues $0x - 0 \in R$

ii)

Dados los vectores

$v_1 = a_1x - a_1 \in R$, con $a_1 \in \mathbb{R}$

$v_2 = a_2x - a_2 \in R$, con $a_2 \in \mathbb{R}$

se tiene que la suma

$$v_1 + v_2 = a_1x - a_1 + a_2x - a_2 = (a_1 + a_2)x - (a_1 + a_2) \in R$$

iii) $\alpha \in \mathbb{R}$, $v = ax - a$, $a \in \mathbb{R} \Rightarrow \alpha v = \alpha(ax - a) = (\alpha a)x - (\alpha a) \in R$

De i), ii) y iii) se concluye que $R \leq \mathcal{P}_1(\mathbb{R})$ $\square$

[2] Responda V (Verdadero) o F (Falso), justificando todas sus respuestas.

a) $[a, -1, a] \in \langle \{[1, a, 0], [a, 0, 1], [0, -1, a]\} \rangle$, con $a \in \mathbb{R}$ constante

b) $\{1, x, x^2, x^3, \dots, x^n\}$ es base de $\mathcal{P}_n(\mathbb{R})$

Justificación:

Recordemos que $\dim(\mathcal{P}_n(\mathbb{R})) = n + 1$ y $B = \{1, x, x^2, x^3, \dots, x^n\}$ posee $n + 1$ elementos, por lo tanto, basta demostrar que B es l.i.

cte $x \ x^2 \ . \ . \ . \ x^n$

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdot & \cdot & \cdot & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdot & \cdot & \cdot & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdot & \cdot & \cdot & 0 \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ 0 & 0 & 0 & \cdot & \cdot & \cdot & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$$

Lo anterior significa que B es *l.i.*, y luego base, es decir, es verdadera la proposición. $\square$

c) Si $S = \{[x, y, z] \in \mathbb{R}^3 / 3x - y + z = 0\}$, entonces $\dim(S) = 2$

Justificación:

Mostremos que primer lugar que $S \leq \mathbb{R}^3$

Notemos que los elementos de S tienen la estructura $[x, y, y - 3x]$, porque $z = y - 3x$

i) $S \neq \emptyset$, pues $[0, 0, 0] \in S$, $3(0) - (0) + (0) = 0$

ii) **Dados**

$$\mathbf{v}_1 = [a, b, b - 3a] \in S$$

$$\mathbf{v}_2 = [c, d, d - 3c] \in S$$

se tiene que

$$\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 = [a, b, b - 3a] + [c, d, d - 3c] = [a + c, b + d, (b + d) - 3(a + c)] \in S$$

$$iii) \alpha \in \mathbb{R}, \mathbf{v} = [x, y, y - 3x] \Rightarrow \alpha \mathbf{v} = \alpha[x, y, y - 3x] = [\alpha x, \alpha y, \alpha y - 3\alpha x] \in S$$

De i), ii) y iii) se tiene que $S \leq \mathbb{R}^3$

Obtengamos ahora una base para S .

$$S = \{[x, y, z] \in \mathbb{R}^3 / 3x - y + z = 0\} = \{[x, y, y - 3x]\}$$

$$= \{x[1, 0, -3] + y[0, 1, 1]\}$$

Notamos que $B = \{[1, 0, -3], [0, 1, 1]\}$ es un conjunto que genera a S , pues todos los elementos de S se pueden escribir como combinación lineal de los elementos de B .

Veamos si B es *l.i.*

$$\alpha_1[1, 0, -3] + \alpha_2[0, 1, 1] = [0, 0, 0] \Rightarrow$$

$$\alpha_1 = 0$$

$$\alpha_2 = 0$$

$$-3\alpha_1 + \alpha_2 = 0 \Rightarrow -3(0) + (0) = 0$$

La solución del sistema anterior es $\alpha_1 = \alpha_2 = 0$, luego B es *l.i.* y por lo tanto base de S . Finalmente $\dim(S) = 2$, pues la dimensión de un espacio vectorial es el número de elementos de una base cualquiera. $\square$

d) $\dim(S) > \dim(T)$, donde $S = \{A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) / A \text{ es antisimétrica}\}$ y $T = \{ax + ay + a, a \in \mathbb{R}\}$

e) Si $\mathbf{a} = [1, 3, 5]$ y $\mathbf{b}$ es paralelo a $\mathbf{a}$, entonces $\{\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{a} \times \mathbf{b}\}$ es base de $\mathbb{R}^3$

f) $\langle \{[a, -a], [2, 3]\} \rangle = \mathbb{R}^2$, con $a \neq 0$, constante

g) Todo conjunto *l.i.* de V es base de V , con V un espacio vectorial real

$$h) \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \in \langle B \rangle, \text{ con } B = \left\{ \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -3 & 3 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \right\}$$

Justificación:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = \alpha \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} + \beta \begin{bmatrix} -3 & 3 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \Rightarrow$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\alpha & 0 \\ \alpha & 2\alpha \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -3\beta & 3\beta \\ 2\beta & 2\beta \end{bmatrix} \Rightarrow$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\alpha - 3\beta & 3\beta \\ \alpha + 2\beta & 2\alpha + 2\beta \end{bmatrix} \Rightarrow$$

$$-\alpha - 3\beta = 1$$

$$3\beta = 1$$

$$\alpha + 2\beta = 1$$

$$2\alpha + 2\beta = 2$$

De la segunda ecuación : $\beta = \frac{1}{3}$

De la tercera ecuación : $\alpha = 1 - 2\beta \Rightarrow \alpha = 1 - \frac{2}{3} \Rightarrow \alpha = \frac{1}{3}$

Reemplazando los valores anteriores en la primera ecuación :

$$-\alpha - 3\beta = 1 \Rightarrow -\frac{1}{3} - 3\frac{1}{3} = -\frac{1}{3} - 1 = -\frac{4}{3} \neq 1$$

Esto muestra que el sistema no posee solución, y por lo tanto es imposible escribir la matriz $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ como combinación lineal de los vectores de B . $\square$

i) El conjunto $\{(2-x)(1+x^2), x^3-1, x(x+3)-1\} \subseteq \mathcal{P}_3(\mathbb{R})$ es l.i.

j) El conjunto $\{\|a\|a, \langle a, b \rangle b, b \times a\}$ es una base de $\mathbb{R}^3$ con $a = [1, 0, -1]$ y $b = -a$

k) $\{proy_a b, proy_b a \times 2i, \|a-b\|b-a\}$ es base de $\mathbb{R}^3$, si $a = [1, 1, 1]$ y $b = [0, -1, 2]$

l) Si $a = 3\hat{i} - 2\hat{k}$ y $b = \hat{j} - 3\hat{k}$, entonces $\{a, b-a, a \times b \times a\}$ es base de $\mathbb{R}^3$

m) $\{A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) / |A| = 0\} \leq \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$

Justificación:

Sea $S = \{A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) / |A| = 0\}$

i) $S \neq \emptyset$, pues $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \in S$ porque $|A| = 0$

ii) Notamos que S no es cerrado para la suma, pues

$A = \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \in S$ porque $|A| = 0$ y $B = \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ 10 & 2 \end{bmatrix} \in S$ porque $|B| = 0$, pero

$A + B = \begin{bmatrix} 8 & 7 \\ 11 & 4 \end{bmatrix} \notin S$ porque $|A + B| = 32 - 77 = -45 \neq 0$

Lo anterior significa que S no es un subespacio vectorial de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ $\square$

n) Si $\{v_1, v_2\}$ es un conjunto linealmente independiente del espacio vectorial V , entonces $B = \{v_1 - v_2, v_1 + v_2, 2v_2 + 3v_1\}$ es linealmente dependiente.

o) La matriz $\begin{bmatrix} a & b \\ b & a \end{bmatrix}$, con $a, b \in \mathbb{R}$, siempre se puede escribir como combinación lineal de $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$ y $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$

p) El vector de coordenadas de $[1, 0, -1]$ con respecto a la base $\{[1, 1, 1], [-1, 1, 0], [0, 0, 1]\}$ es $[-1, 1, 2]$

[3] Muestre que si $p(x) = ax^2 + ax + a$, con $a \neq 0$, entonces

$B = \left\{ p(x), \frac{dp(x)}{dx}, \frac{d^2p(x)}{dx^2} \right\}$ es base de $\mathcal{P}_2(\mathbb{R})$.

[4] Muestre que el conjunto de todas las matrices antisimétricas de orden 2 es un subespacio vectorial de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$

[5] Obtenga en $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ un conjunto l.d. que no contenga a la matriz nula.

[6] Obtenga una base para $\mathbb{R}^3$ que incluya al vector $[1, -2, 0]$

[7] Determine un subconjunto de $\mathcal{P}_2(\mathbb{R})$ que sea l.i. y que no sea base

[8] Determine un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^2$, distinto de los subespacios triviales