Reconstrucción paleoambiental y análisis forense

Juan Pedro Ferrio

Dpto. Botánica, Universidad de Concepción

Universidad de Concepción

“Isotopos estables: fundamentos y aplicaciones en ciencias naturales” 16 al 20 de enero, 2017

Universidad
de Concepción

Dirección de
Extensión
UdeC

ESCUELA
DE VERANO
UdeC

DIRECCIÓN DE
POSTGRADO

FONDECYT
N° 11150914

PROGRAMA
DOCTORADO EN
SISTEMÁTICA
Y BIODIVERSIDAD

DOCTORADO EN OCEANOGRAFÍA

Proyecto “Red_Clima_Rec”

FONDEQUIP
EQM 150018

Isótopos en anillos de crecimiento

- carbono
- oxígeno
- nitrógeno

Isótopos en restos fósiles / subfósiles de vegetales

- Evolución climática
- Disponibilidad hídrica y nutricional en agricultura

Isótopos en anillos de crecimiento

Dendrocronología / dendroclimatología

Un anillo es una capa de madera producida en una estación de crecimiento
Anillos anchos se asocian a condiciones favorables, anillos estrechos a condiciones desfavorables: limitación por agua, radiación, nutrientes...

Datación cruzada

Datación cruzada permite reconstruir series largas (hasta 8000 años)

Isótopos en anillos de crecimiento

Datación cruzada
(pino carrasco)

madera de primavera/otoño
(roble)

Preparación de muestras (^{18}O)

Preparación de muestras (^{15}N)

De la hoja al anillo

De la hoja al anillo

Muestreo quincenal

Discos corteza

Hoja Xilema Suelo

Exudado floema

Extracción WSOM

Destilación agua

HPLC

(Contenido azúcares)

IRMS

(Isótopos estables)

Final de temporada

Testigos de madera

oak

3000 μm

beech

3000 μm

Rodajas madera (40μm) datadas a partir de crecimiento radial

De la hoja al anillo

ROBLE:

- $\delta^{18}\text{O}$ madera $\approx$ floema $>$ hoja

HAYA:

- $\delta^{18}\text{O}$ madera $\approx$ floema $>>$ hoja

De la hoja al anillo

ROBLE:

- $\delta^{18}\text{O}$ madera $\approx$ floema $>$ hoja
- $\delta^{13}\text{C}$ madera $\approx$ floema $\approx$ hoja
- Carga variable floema
- $\approx$ rápido transporte y poco almacenaje

HAYA:

- $\delta^{18}\text{O}$ madera $\approx$ floema $>>$ hoja
- $\delta^{13}\text{C}$ madera $\approx$ floema $>>$ hoja
- Constant floema load
- $\approx$ transporte lento y alto almacenaje

Estudio retrospectivo del decaimiento

‘Evitación de sequía’ - fuerte control estomacal como prevención de fallo hidráulico: especies conidricas (mortalidad por ‘hambre’)

‘Tolerancia a sequía’ - bajo control estomacal y elevada transpiración: especies anisohídricas (mortalidad por ‘sed’)

Allen et al. (2010)

Estudio retrospectivo del decaimiento

Decaimiento de pino albar en la sierra de Gúdar (Teruel)

Decaimiento selectivo
Sin diferencias aparentes
entre sanos y decaídos

2002 → present

Estudio retrospectivo del decaimiento

Material vegetal y estrategia de muestreo

Edad a 1.30m (y)

<i>Healthy</i>	93.8% (± 7.52)
<i>Declining</i>	79.8% (± 7.51)
	$P=0.380$

Edad en ápice (y)

<i>Healthy</i>	27.0% (± 2.76)
<i>Declining</i>	33.0% (± 4.18)
	$P=0.394$

DBH (cm)

<i>Healthy</i>	14.4% (± 0.41)
<i>Declining</i>	15.8% (± 1.92)
	$P=0.535$

Defoliación (%)

<i>Healthy</i>	11.7% (± 8.66)
<i>Declining</i>	65.0% (± 4.41)
	$P=0.003$

Estudio retrospectivo del decaimiento

Diferencias pre-decaimiento: crecimiento

Until mid 90s,
declining trees grew faster
...but more erratic

Reducción en crecimiento, pero a distinto ritmo

Estudio retrospectivo del decaimiento

ISÓTOPOS ESTABLES (1,30m)

SANOS

DECAÍDOS

Control
estomáxico
de las
pérdidas de
agua

Estudio retrospectivo del decaimiento

Respuesta post-decaimiento: $\Delta^{13}\text{C}$ y $\delta^{18}\text{O}$

!¿! Reducción en EUA y temperatura foliar !?!

Decaimiento bosque costero tras tsunami (Miyagi, Japón)

Cambios isotópicos tras tsunami en Japón

Parcela de bosque costero en Ishinomaki
Sin daños físicos debido al tsunami

Pero rápido descenso en crecimiento

¿Daño por intrusión marina?

- Estrés salino
- Pérdida de nutrientes
- Debilitación y ataque patógenos

Cambios isotópicos tras tsunami en Japón

Restos arqueobotánicos

Carbones en el sedimento, *Tell Halula*, Siria (J.L.Araus, Univ. Barcelona)

Restos arqueobotánicos

Sistema de flotación (Grup d'Investigació Prehistòrica, Univ. Lleida)

Restos arqueobotánicos

Semillas carbonizadas de cebada en *Ciutat de Lleida* (N. Alonso)
carbones de Pino carrasco de *Tossal de les Tenalles* (J.P. Ferrio)

Restos arqueobotánicos: clima

$\Delta^{13}\text{C}$ en madera determinada por la cantidad de precipitación

Restos arqueobotánicos: clima

La señal climática de $\Delta^{13}\text{C}$ se preserva en carbones fósiles

Restos arqueobotánicos: clima

Pino carrasco, Depresión Central Ebro (NE Spain)

Estima de precipitación annual de los últimos **4,000 years**:

- **Pasado**= 450-520 mm
- **Presente**= 350-400 mm

En promedio, 20-40% más precipitación en el pasado

Respuesta ambiental y paleoreconstrucción

Disponibilidad hídrica

Restos arqueobotánicos: cultivos

Araus *et al.* 1997. *Global Change Biology*
 Araus *et al.* 1999. *Global Change Biology*
 Ferrio *et al.* 2005. *Veg. Hist. & Archaeobotany*

Clima y condiciones de cultivo

Disponibilidad hídrica

Sostenibilidad en los orígenes de la agricultura

¿Hasta qué punto era sostenible la agricultura del pasado?

Sostenibilidad en el origen de la agricultura

Tell Halula, Neolítico, Eúfrates medio (10.000-8.000 BP)

Halula, poblado actual
(región de Aleppo, NO Siria)

Tell Halula, Yacimiento neolítico

Contents lists available at SciVerse ScienceDirect

Journal of Arid Environments

journal homepage: www.elsevier.com/locate/jaridenv

Agricultural expansion and settlement economy in Tell Halula
(Mid-Euphrates valley): A diachronic study from early Neolithic to present

J.P. Ferrio ^{a,*}, G. Arab ^b, R. Buxó ^c, E. Guerrero ^d, M. Molist ^d, J. Voltas ^a, J.L. Araus ^e

Rendimiento a partir de $\Delta^{13}\text{C}$ y tamaño del grano

Rendimiento a partir de $\Delta^{13}\text{C}$ y tamaño del grano

$\delta^{13}\text{C}$ Δ

Cambios $\delta^{13}\text{C}$ aire

$\Delta^{13}\text{C}$ y rendimiento

$\text{Yield} = 0.0054 e^{0.40 \cdot \Delta}$

$\delta^{13}\text{C}$
-23.35 ‰
-23.62 ‰

Δ
17.17 ‰
17.46 ‰

Rendimiento cond. actuales:
5.36 Mg ha⁻¹
6.02 Mg ha⁻¹

Rendimiento a partir de $\Delta^{13}\text{C}$ y tamaño del grano

$\delta^{13}\text{C}$ Δ

Cambios conc. CO₂
Índice de cosecha

Cambios $\delta^{13}\text{C}$ aire

$\Delta^{13}\text{C}$ y rendimiento

$\text{Yield} = 0.0054 e^{0.40 \cdot \Delta}$

Cambios peso potencial

$\delta^{13}\text{C}$
-23.35 ‰
-23.62 ‰

Δ
17.17 ‰
17.46 ‰

Rendimiento cond. actuales:
5.36 Mg ha⁻¹
6.02 Mg ha⁻¹

Corrección:
0.6 x 0.5 = 0.3

Corrección por tamaño potencial pasado / presente

Rendimiento en antigüedad:
1.61 Mg ha⁻¹
1.81 Mg ha⁻¹

Descenso en producción de grano

Descenso en Rendimiento de trigo (según 13C)

Descenso en la diversidad

Descenso en Rendimiento de trigo (según 13C)

Aumento de malas hierbas de cereal

Descenso en Diversidad

Descenso en fertilidad a largo plazo

Gran expansión agrícola (número de yacimientos) *(aumento de la presión demográfica)*

Descenso en la fertilidad del suelo *(baja $\delta^{15}\text{N}$)*

ARTICLE
 Received 24 Dec 2013 | Accepted 24 Apr 2014 | Published 23 May 2014
 DOI: 10.1038/ncomms4953

Agronomic conditions and crop evolution in ancient Near East agriculture

José L. Araus^{1,*}, Juan P. Ferrio^{2,*}, Jordi Voltas^{2,*}, Mònica Aguilera² & Ramón Buxó³

Ideas principales

Anillos de crecimiento:

Integra cambios a largo plazo, a menudo pretratamiento (eliminación resinas, lignina)

Reconstrucción cambios climáticos y patrones fisiológicos (p.ej. decaimiento)

Restos arqueobotánicos: carbonizados, reconstrucción clima y cultivos

Reconstrucción dietaria y migración

- Nivel trófico
- Migración altitudinal

Certificación de origen y autenticidad

- Fraude alimentario (adulteraciones)
- Origen y alimentación animales

Somos lo que comemos: nivel trófico y dieta

Somos lo que comemos: movilidad

Somos lo que comemos: movilidad

Variación isotópica de carbono en pastos Domina el gradiente altitudinal

Variación isotópica del agua Domina la evolución estacional

Somos lo que comemos: movilidad

Max. evento cálido (julio-agosto 2014)

Alimentación en valle (aumento valores d13C)

Acceso a pasto de altura (descenso valores d13C)

Ratio C_3/C_4 varía según gradiente climático

Leaf $\delta^{13}C_p$, ‰

Transiciones de dieta C3 / C4

Dieta humana refleja transición a cultivo maíz

Cambio a dieta dominada por C4 (maíz)
Indica la transición a la agricultura en poblaciones indígenas (Florida)

Investigación forense: ¿cebada o maíz?

Cebada/trigo

Maiz

Investigación forense: ¿cebada o maíz?

Cebada/trigo

Maiz

Reinheitsgebot(1516)
Ley de pureza alemana
“cebada, agua y lúpulo”

Investigación forense: ¿cebada o maíz?

Cebada/trigo

Maiz

Reinheitsgebot(1516)
Ley de pureza alemana
 “cebada, agua y lúpulo”

Identificación de fraude alimentario

Investigación forense: jamón de bellota

Tecnologías | Tecnología de los alimentos

El análisis de los isótopos estables determina la calidad del cerdo ibérico de Guijuelo

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Guijuelo ha recurrido a los expertos de la Universidad de Salamanca para que certifiquen la calidad de sus productos ibéricos mediante los análisis más avanzados. En la actualidad, el mejor sistema para saber si un cerdo ha comido bellota es el análisis de su grasa mediante una técnica que mide las relaciones de isótopos estables y, precisamente, la institución académica salmantina posee en este campo un laboratorio de referencia nacional.

Pienso
(Carbohidratos C₃ y C₄)

Salamanca - ACTUALIDAD - PROVINCIAL

AECERIBER solicita al Ministerio la retirada del sistema de calidad del ibérico a través de isótopos

Martes, 19 de enero

La Asociación Española del Cerdo Ibérico solicitará al Ministerio de Medio Rural que intervenga ante la Denominación de Origen Guijuelo, para que se deje de aplicar el método de medición de la calidad del ibérico a través de isótopos

Ideas principales

Dieta:

Nivel trófico enriquece,
Migraciones y cambios de dieta
Transiciones C3/C4

Certificación:

Distintos orígenes o consumo de alimentos
determinan la señal isotópica
Adulteraciones cambian la señal